

OLIGO-ÉLÉMENTS

ACTIV BORE Zn

Engrais CE — RCE 2003/2003

1L 5L 10L 20L



Rôle agronomique. Deux carences fréquentes traitées en un passage : le bore pour la nouaison, le zinc pour la croissance des jeunes pousses.

DOSAGE PAR CULTURE

Maraîchage	2-3 L/ha — 4 applications — surface foliaire bien développée, tous les 10-15 jours
Tournesol	3 L/ha — du stade 6-8 paires de feuilles
Betterave	3-4 L/ha — 1ère application stade 6-8 feuilles, 2ème application T1 + 3 semaines
Arbres fruitiers	1 L/ha — 4 applications — 1ère avant floraison, suivantes toutes les 2 semaines
Vigne	1 L/ha — 4 applications — stade grappes séparées, boutons floraux, nouaison, véraison

COMPOSITION GARANTIE

Bore (B)	77 g/L (6,1 %)
Zinc (Zn)	33 g/L (2,6 %)
Soufre (SO ₃)	42 g/L (SO ₃ 3,3 %)

APPLICATION

Foliaire et au sol

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION


 Densité **1,28 kg/L**

- Bore + zinc en une seule application foliaire
- Bore éthanolamine + zinc heptahydraté
- Croissance et qualité sur cultures sensibles