

OLIGO-ÉLÉMENTS

ACTIV BORE

Engrais CE — RCE 2003/2003

1L 5L 10L 20L



Rôle agronomique. Le bore intervient dans la fécondation : quand il manque, les fleurs coulent avant de nouer. ACTIV BORE corrige ce déficit, en foliaire comme au sol.

DOSAGE PAR CULTURE

Maraîchage	2-3 L/ha — 4 applications — surface foliaire bien développée, tous les 10-15 jours
Tournesol	3 L/ha — du stade 6-8 paires de feuilles
Betterave	3-4 L/ha — 1ère application stade 6-8 feuilles, 2ème application T1 + 3 semaines
Arbres fruitiers	1 L/ha — 4 applications — 1ère avant floraison, suivantes toutes les 2 semaines
Vigne	1 L/ha — 4 applications — stade grappes séparées, boutons floraux, nouaison, véraison

COMPOSITION GARANTIE

Bore (B)	150 g/L (11 %)
----------	----------------

APPLICATION

Foliaire et au sol

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION



Densité **1,34 kg/L**

- Bore éthanolamine, assimilation rapide
- Sécurise la nouaison sur arbres fruitiers et vigne
- Corrige une carence visible en quelques passages