

OLIGO-ÉLÉMENTS

ACTIV Ca

Engrais CE — RCE 2003/2003

1L 5L 10L 20L



Rôle agronomique. Le calcium fait la fermeté du fruit et sa tenue après récolte. Quand il n'arrive pas jusqu'au fruit, c'est le bitter-pit et les microfissures.

DOSAGE PAR CULTURE

Salades et cultures maraîchères	4-5 L/ha par passage — du stade 4-6 feuilles BBCH 14-16, puis tous les 8-10 jours
Arboriculture — fruits à noyaux	150-250 cc/ha — à partir du stade jeune fruits BBCH 71, puis tous les 10-15 jours
Pommiers	300-400 cc/ha — à partir de la nouaison BBCH 71, pendant le grossissement BBCH 71-77 — 5 à 8 passages
Agrumes	5 L/ha — 3 passages de la nouaison au grossissement
Fruits à pépins	7 à 10 L/ha — plusieurs applications, à partir de la taille d'une noix jusqu'à la récolte

COMPOSITION GARANTIE

Calcium (CaO) 170 g/L (CaO 15 % p/p)

APPLICATION

Foliaire

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION



Densité 1,14 kg/L

- Chlorure de calcium très soluble, 170 g/L CaO
- Préviens bitter-pit et fissures de l'épiderme
- Meilleure conservation après récolte