

OLIGO-ÉLÉMENTS

ACTIV Cu

Engrais CE — RCE 2003/2003

1L 5L 10L 20L



Rôle agronomique. Le cuivre est essentiel à la photosynthèse et aux enzymes de la plante. Une carence affaiblit le feuillage.

DOSAGE PAR CULTURE

Salades et cultures maraîchères	2,2–4,4 L/ha — début croissance BBCH 14–16, avant floraison BBCH 55–57 — 2 à 4 applications, tous les 10–14 jours
Arboriculture	3,3–5,6 L/ha — apparition boutons floraux BBCH 55, chute des pétales BBCH 65–67, nouaison BBCH 71, basculement BBCH 74
Céréales / Maïs	1,7–3,3 L/ha — début tallage BBCH 21, montaison BBCH 30–32
Horticulture	1,1–2,2 L/ha — apparition des premières feuilles, avant les périodes de stress

COMPOSITION GARANTIE

Cuivre (Cu)	120 g/L (9,2 %)
Soufre (SO ₃)	150 g/L (SO ₃ 11,5 %)

APPLICATION

Foliaire

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION



Densité

1,23 kg/L

- Sulfate de cuivre, 120 g/L de Cu
- Soutient photosynthèse et enzymes
- Corrige les carences en cuivre