

OLIGO-ÉLÉMENTS

ACTIV K 500

Engrais CE — RCE 2003/2003

1 L 5 L 10 L 20 L



Rôle agronomique. Le potassium fait le calibre, la couleur et le sucre du fruit en fin de cycle. ACTIV K 500 en concentré 506 g/L pour la finition.

DOSAGE PAR CULTURE

Colza	2 à 4 L/ha — entre le stade EBBCH 59 et F1/G1 BBCH 71
Pois / Féverole / Haricot	2 à 4 L/ha — 1ère applic. au stade boutons floraux BBCH 51, 2ème applic. à la formation des gousses BBCH 71
Oignon / Ail / Échalotte	2 à 4 L/ha — 1ère applic. formation du bulbe BBCH 41, 2ème applic. grossissement BBCH 45, 3ème applic. 21 jours après (BBCH 45 + 21 jours)
Pomme de terre	2 à 4 L/ha — 1ère applic. début floraison BBCH 60, 2ème applic. fin floraison BBCH 69, 3ème applic. 15 jours après (BBCH 69 + 15 jours)
Pommiers / Pêchers / Abricotiers	2 à 4 L/ha — 1ère applic. chute des pétales BBCH 65, 2ème applic. après nouaison BBCH 71, 3ème applic. grossissement du fruit BBCH 75
Vigne	2 à 4 L/ha — 1ère applic. début nouaison BBCH 71, 2ème applic. fermeture de la grappe BBCH 79, 3ème applic. début véraison BBCH 81
Fraisiers et petits fruits rouges	2 à 4 L/ha — 1ère applic. formation du fruit BBCH 67, 2ème applic. grossissement BBCH 71, 3ème applic. début coloration BBCH 81
Cucurbitacées	2 à 4 L/ha — 1ère applic. formation du fruit BBCH 67, 2ème applic. grossissement BBCH 71, 3ème applic. début coloration BBCH 81
Agrumes / Oliviers	2 à 4 L/ha — 1ère applic. avant floraison, 2ème applic. à nouaison, 3ème applic. au grossissement du fruit

COMPOSITION GARANTIE

Azote (N)	45 g/L (3,1 % uréique)
Potassium (K ₂ O)	506 g/L (34,3 %)

APPLICATION

Foliaire

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION



Densité

1,47 kg/L

● K₂O 506 g/L, très concentré

● Calibre, coloration et qualité des fruits

● Azote uréique associé : N + K en un passage