

OLIGO-ÉLÉMENTS ACTIV Mg



5 L

Rôle agronomique. Le magnésium est au cœur de la chlorophylle : sans lui, pas de photosynthèse. Une carence jaunit les vieilles feuilles.

DOSAGE PAR CULTURE

Vigne	5 L/ha, 2 à 3 applic. — Nouaison BBCH 71, Fermeture de la grappe BBCH 79, Véraison BBCH 81–85
Baies	2 à 3 L/ha, 2 à 4 applic. — Développement feuilles BBCH 10–18, Formation des fleurs BBCH 55, Formation des fruits BBCH 71, Coloration des fruits BBCH 81
Poivron, Tomate, Aubergine, Courgette	2 à 3 L/ha, 2 à 4 applic. — Feuilles étalées BBCH 20, Nouaison BBCH 71, Grossissement BBCH 81
Arbres fruitiers	5 L/ha, 3 à 4 applic. — Boutons floraux BBCH 55, Nouaison BBCH 71, Grossissement fruits BBCH 77
Céréales	5 L/ha, 1 à 3 applic. — Du stade début tallage au stade épi de 1 cm BBCH 20–30
Carotte, Navet, Betterave	2 à 3 L/ha, 2 à 4 applic. — Développement foliaire BBCH 18–20, Début grossissement des racines BBCH 41
Tournesol	5 L/ha — 5 à 6 paires feuilles BBCH 15–16, Apparition boutons étoilés BBCH 59
Légumes feuilles	2 à 3 L/ha, 2 à 4 applic. — 6 à 8 feuilles BBCH 16–18, Milieu de cycle BBCH 41
Horticulture	200 cc/ha par application — 1 passage toutes les 2 à 4 semaines selon la plante

COMPOSITION GARANTIE

Magnésium (Mg)	7,5% — 93 g/L
Soufre (SO ₃)	15,1% (SO ₃) — 188 g/L

APPLICATION

Foliaire

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION



Densité **1,24 kg/L**

- Sulfate de magnésium, absorption foliaire rapide
- Relance la photosynthèse
- Floraison et fructification plus régulières