

OLIGO-ÉLÉMENTS

ACTIV ZN



5 L

Rôle agronomique. Le zinc commande la croissance et la synthèse des protéines. Les sols marocains en manquent souvent, et la plante reste rabougrie.

DOSAGE PAR CULTURE

Maïs	5 L/ha — Stade 2 à 4 feuilles BBCH 12-14
Céréales	2 à 3 L/ha — À partir du tallage BBCH 21, Montaison BBCH 30-39
Tomate, Aubergine, Poivron	4 à 5 L/ha par passage — Feuilles étalées BBCH 20, Début floraison BBCH 51, Développement fruits BBCH 81
Pomme de terre	1 à 2,5 L/ha par passage — 1ère appli : stade levée, 2ème appli : stade tubérisation
Arbres fruitiers, Agrumes	2 à 4 L/ha — Pré-floraison BBCH 55, Formation des fruits BBCH 77
Vigne	2 à 4 L/ha — 1ère appli : Feuilles étalées BBCH 14, 2ème appli : Avant la floraison BBCH 57
Olivier	3 à 4 L/ha — Avant la floraison BBCH 55, Durcissement noyaux BBCH 74-77

COMPOSITION GARANTIE

Zinc (Zn)	12% — 170 g/L
Soufre (SO ₃)	15% (SO ₃) — 208 g/L

APPLICATION

Foliaire

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION


 Densité **1,38 kg/L**

- Sulfate de zinc concentré, 170 g/L
- Relance la croissance des jeunes pousses
- Soufre associé pour les protéines